UŞAQ SEREBRAL İFLİCLİ XƏSTƏLƏRDƏ GÖRMƏ ORQANININ POZULMALARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məmmədova M.N., Şirəliyeva R.K.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı

Aktuallıq. Antenatal və perinatal dövrdə orqanizmin formalaşmasına mənfi təsir edən amillər eyni zamanda baş beyin və görmə orqanında fəsadlar törədə bilər. Neyro oftalmoloji pozulmalar uşaq serebral iflicli (USİ-li) xəstələrdə əsas və tez tez rast gəlinən patologiyalardandır. Diaqnozun qoyulması və pozulmuş hərəkəti, nitq, psixi funksiyaların bərpası üçün görmə orqanındakı patologiyanın vaxtında aşkarlanaraq korreksiya aparılması önəmlidir.

Məqsəd. Aparadığımız tədqiqatda USİ-li xəstələrdə daha çox hansı oftalmoloji patologiyanın olmasını aşkarlamaq.

Material və metodlar. 2006-2009-cu illərdə Bakı şəhəri Uşaq nevroloji xəstəxanasına müraciət edən 1-15 yaş arası USİ-li xəstələrin xəstəlik tarixləri retrospektiv tədqiq edilmişdir. Oftalmoloji müayinədən keçən 550 (346 oğlan, 204 qız) xəstəlik tarixi araşdırılmışdır. XBT 10-a görə G80.0 ikili hemiplegiya tipi - 335 xəstə, G80.1 spastik diplegiya tipi - 75 xəstə, G80.2 hemiplegiya tipi - 64 xəstə, G80.3 diskinetik tip - 15 xəstə, G80.4 ataktik tip - 23 xəstə, G80.8 qarışıq tip - 14 xəstə, G80.9 dəqiqləşdirilməmiş tip - 24 xəstə. Bu kogortanın 89,4%-də (492 xəstə) patologiya aşkarlanmışdır.

Nəticə. Anomaliya - anoftalmiya, anadangəlmə xorioretinit, mikrokornea, koloboma,

makulopatiya 1,8% (10 xəstə), astigmatizm 1,4% (8 xəstə), qlaukoma 0,2% (1 xəstə), görmə siniri məməciyi patologiyası - atrofiya, durğun disk, göz dibi arteriya və venalarında dəyişikliklər 14,2% (78 xəstə), konvergensiya olmaması, zəifləməsi 0,4% (2 xəstə), görmə fiksasiyası və izləmənin olmaması, zəifləməsi 0,4% (2 xəstə), nistagm 4,7% (26 xəstə), miopiya 2,7% (15 xəstə), ambliopiya 1,4% (8 xəstə), hipermetropiya 1,4% (8 xəstə), astigmatizm 1,4% (8 xəstə), çəpik 54,2% (298 xəstə), gözün hərəkəti aparatı tərəfindən göz əzələlərinin parezi 1,1% (6 xəstə). Bu patologiyalar tam izolə olunmuş şəkildə deyil 2-3 patoloji xüsusiyyət eyni xəstədə qeyd olunmuşdur. Bundan əlavə 1 xəstədə albinotik tipli göz dibi, albalı çəyirdəyi tipli göz dibi 1 xəstədə təyin edilmişdir.

Xulasə. Bizim apardığımız tədqiqatda çəpik üstünlük təşkil etmişdir. USİ-li xəstələr zamanında oftalmoloji müayinədən keçirilməlidir ki, bu həm differensial diaqnozun aparılmasına yönləndirici təsir edər, həm də aşkarlanmış patologiya mümkün olan qədər tez korreksiya edilir. Bu da öz növbəsində xəstələrin ətraf mühitdə görmə oriyentasiyasının keyfiyyətini artırır və bununla da bilavasitə onların sosial adaptasiyalarının tempini sürətləndirər.

SUMMARY

OPHTHALMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY

M.N.Mammadova, R.K.Shiraliyeva

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, Baku

Patients with cerebral palsy need timely eye examination. Detection of ophthalmic disorders in patients with cerebral palsy will possibly their timely correction by adjusting the orientation of the visual quality of the environment, and thus it is possible to speed up the pace of social adaptation. In our research CP the most frequent ophthalmological problem was strabismus.

Key words: cerebral palsy, ophthalmic disorders, strabismus.